



Nombre: FURIA®

Noviembre 2024

Teléfonos de emergencia toxicológica:

SAMU: 106
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA SUCURSAL: 421 4811

Teléfonos De Emergencia Química:

CHEMTREC (+ 51) 17071295

Página 1 de 2

FICHA TECNICA

FURIA®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Reg. PQUA Nro. 311-96-AG- SENASA

Titular del Registro: FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN:

Zeta cypermetrina..... 180 g/l
Aditivos..... c.s.p. 1 L

GENERALIDADES

FURIA® es un insecticida piretroide sintético. Actúa por ingestión y contacto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	mL/ha		
ALGODÓN	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	250*	250*	7	0,05-.05
PAPA	Mosca Minadora (adulto)	<i>Linomyza huidobrensis</i>	75-100	150-300	7	0,05
	Gorgojo de los Andes	<i>Prennotrypes</i> sp	200			
	Pulgilla saltona	<i>Epifrix</i> sp	200			
AJO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		150-200	7	0,05
MARIGOLD	Mosca Barrenadora	<i>Melanagromyza</i> sp	200		7	0,05
MAIZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150-200		7	0,05
	Gusano de tierra	<i>Agrotis, feltia y rodenia</i>	250			
ESPARRAGO	Gusano de tierra	<i>Agrotis, feltia y prodenia</i>	250		7	0,05
FRIJOL	Gusano de tierra	<i>Agrotis, feltia y prodenia</i>	250		7	0,05
	Cigarrita	<i>Empoasca</i> sp	300			
ALCACHOFA	Spodoptera	<i>Spodoptera eridania</i>	150-200		N.A	N.A.
	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100-150			
CRISANTEMO	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>		300	N.A	N.A
ROSA	Pulgón	<i>Macrosiphum rosae</i>		300	N.A	N.A
PIMIENTO	Gusano de foliador	<i>Spodoptera eridania</i>	150-200		N.A	0,2
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150-200		N.A	0,1
ALMACENAJE DE TUBERCULOS, SEMILLAS Y GRANOS ALMACENADOS						
PAPA	Polilla	<i>Pthorimaea</i>	150		Desinfección del almacén antes de depositar los tubérculos.	
FRIJOL	Gorgojo del frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	200		Aplicar antes de envasar.	
MAIZ	Gorgojo del maíz	<i>Sitophilus oryzae</i>	200			

*Usar bomba de motor

LMR: Límite máximo de residuos (en ppm).

PC = Última aplicación a la cosecha en días.

N.A = No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para preparar la mezcla, llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de **FURIA®** recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

- **Furia®** no representa efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.
- **Furia®** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.
- En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible.

GUIA PARA EL MÉDICO

ANTÍDOTO: Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disuelto en agua deberá ser dado. También usar 15 a 20.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE
O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA**

OTRA INFORMACIÓN

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. REALIZAR OBLIGATORIAMENTE EL TRIPLE LAVADO DEL PRESENTE ENVASE. DEVUELVA EL ENVASE TRIPLE LAVADO AL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**